

WdH

• Streufunktion $I = \frac{d}{dt} \langle n \rangle = -i \text{Tr} \{ Z'(t) \rho(t) \}$ $\rho(t) = e^{Z(t) \cdot t} \rho_0$

z.B. $Z = Z_0 + \sum_{\nu} Z^{(\nu)}$ $\rightarrow Z(\vec{x}) = Z_0 + \sum_{\nu} Z^{(\nu)}(x^{\nu})$
 \uparrow \uparrow
 $-i \{H_0, \rho\}$ $\text{Bad } \nu$ $I_{\nu}^{(\nu)} = -i \text{Tr} \{ \partial_{x^{\nu}} Z(\vec{x}) \rho(t) \}$
 in SS gilt $\sum_{\nu} I_{\nu}^{(\nu)} = 0$


• Bsp. SET

$P_n(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A(z,t) e^{-i n z} dz = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{Tr} \{ \rho(z,t) \} \cdot e^{-i n z} dz$
 $= e^{C(z,t)} \approx e^{\lambda_{\text{min}}(z) t} e^{Z(z) \cdot t} \rho_0$

• Absorptionskammer



• Energie-angefüllte FCS: $Z_0 + \sum_n Z_n \rightarrow Z_0 + \sum_n Z_n \cdot e^{-\beta \Delta E_n} = Z(\xi)$
 \uparrow \uparrow
 Sprung mit ΔE_n $\text{hat 1 Teilchen ändert}$



3.3. Wartestellen vs. FCS

a) • nur ein Sprungtyp:

+ WS für keinen Sprung $[0, t]$ $P_0(t) = \text{Tr} \{ e^{Z_0 \cdot t} \rho_0 \}$
 + " $[0, t+dt]$ $P_0(t+dt)$

+ WS für einen Sprung in $[t, t+dt]$ $W(t) \cdot dt = P_0(t) - P_0(t+dt) \rightarrow W(t) = -\frac{dP_0(t)}{dt} = -\text{Tr} \{ Z_0 \cdot e^{Z_0 t} \rho_0 \}$

WT-Verteilung

$\langle \bar{n} \rangle = \int_0^{\infty} W(t) \cdot t dt$ $\text{mittl. Wartest.$

b.) Was ist die WT-Verteilung zwischen zwei versch. Sprüngen Z_1 & Z_2

betr. Ende des Propagators
 Anteil für 1 Sprung

$\int_0^{t_1} e^{Z_0(t-t_1)} Z_1 e^{Z_0 t_1} dt_1 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} t \cdot Z_1 \dots$
 $Z = Z_0 + \sum_{i=1}^N Z_i$

DM durch weiteren Sprung: $\rho_0^{(1)} = \frac{Z_1 \rho_0}{\text{Tr} \{ Z_1 \rho_0 \}} = \frac{Z_1 \rho_0}{\text{Tr} \{ Z_1 \rho_0 \}} \rightarrow \text{wird A 2}$

jetzt: WZ-Verteilung zwischen Sprung 1 des Typs ① & Sprung 2 des Typs ②

$$W^{ii}(t) = -\text{Tr} \{ Z_0 e^{Z_0 t} \rho_0^{(i)} \} = \text{Tr} \{ (Z - Z_0) e^{Z_0 t} \rho_0^{(i)} \} = \sum_{j \neq i} \text{Tr} \{ Z_j e^{Z_0 t} \rho_0^{(j)} \}$$

\uparrow WZ-Verteilung für bel. Sprung nach Sprung i; $\text{Tr} \{ Z \hat{0} \} = 0$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} Z - Z_0 = \sum_{j \neq i} Z_j \\ \text{WZ-Verteilung zwischen Sprung ①} \rightarrow \text{②} \\ W^{ii}(t) = \frac{\text{Tr} \{ Z_j e^{Z_0 t} Z_j \bar{\rho} \}}{\text{Tr} \{ Z_j \bar{\rho} \}} \end{array} \right]$$

jetzt: $\rho_0 = \bar{\rho}$
 $Z \bar{\rho} = 0$

Konstante für einen Sprung: $W^{ii}(t) = \frac{\text{Tr} \{ Z_j e^{Z_0 t} Z_j \bar{\rho} \}}{\text{Tr} \{ Z_j \bar{\rho} \}} = \text{Tr} \{ (Z - Z_0) e^{Z_0 t} \rho_0 \} = -\text{Tr} \{ Z_0 e^{Z_0 t} \rho_0 \}$

$$\rho_0 = \frac{Z_j \bar{\rho}}{\text{Tr} \{ Z_j \bar{\rho} \}}$$

BSP a) SRL $f \int \hat{1} \circ$

$$Z_0 = \Gamma \begin{pmatrix} -f & 0 \\ 0 & -(1-f) \end{pmatrix}$$

$$Z_1 = \Gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ f & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{rez})$$

$$Z_2 = \Gamma \begin{pmatrix} 0 & 1-f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{raus})$$

$$\bar{\rho} = \begin{pmatrix} 1-f \\ f \end{pmatrix}$$

$\text{rez} \rightarrow \text{rez} \quad \text{raus} \rightarrow \text{rez (det. ist leer)}$
 \downarrow
 0
 \uparrow
 $\text{raus} \rightarrow \text{raus}$

$$W(t) = \begin{pmatrix} 0 & \Gamma f \cdot e^{-\Gamma f t} \\ \Gamma(1-f) e^{-\Gamma(1-f)t} & 0 \end{pmatrix}$$


b) SET $f_L \rightarrow \Gamma_L \circ \Gamma_R \rightarrow f_R \rightarrow 0$

$$Z_0 = \begin{pmatrix} -\Gamma_L & 0 \\ 0 & -\Gamma_R \end{pmatrix}$$

$$Z_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \Gamma_L & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{raus})$$

$$Z_2 = \begin{pmatrix} 0 & \Gamma_R \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{raus})$$

$$\rightarrow W(t) = \begin{pmatrix} 0 & \Gamma_L \cdot e^{-\Gamma_L t} \\ \Gamma_R \cdot e^{-\Gamma_R t} & 0 \end{pmatrix}$$



3.4. Mikroskop. Ableitung von Zählfeldern (zum Mikroskop)

Zähle mal in Reservoir



Bad-Observable $\hat{O} = \sum_{\alpha} \overset{E_{\alpha}}{\downarrow} O_{\alpha} |e\rangle\langle e|$
 Annahme: $[\hat{O}, H_B] = 0$ ($H_B = \sum_{\alpha} E_{\alpha}^2 |e\rangle\langle e|$)

Zweipunkt-Messung $\left. \begin{array}{l} 1. \text{ Messung } t_0=0 \\ 2. \text{ Messung } t \end{array} \right\} \text{Differenz}$

1. Messung: Messpostulat $\bar{\rho}_B \xrightarrow{e} \frac{|e\rangle\langle e| \bar{\rho}_B |e\rangle\langle e|}{P_e} = \frac{\bar{\rho}_B^{(e)}}{P_e}$
 $P_e = \text{Tr}\{|e\rangle\langle e| \bar{\rho}_B\}$

MGF (in die Differenz der Messergebnisse)

$\mu_{tot}(z, t) = \sum_{\alpha} \text{Tr}\{e^{+iz(\hat{O}-O_{\alpha})} \mu(t) \rho_{\alpha}^e \otimes \bar{\rho}_B^{(e)} \mu^+(t)\}$ z.B.: $-i\partial_z \mu(z, t)|_{z=0} = \sum_{\alpha} \text{Tr}\{(\hat{O}-O_{\alpha}) \rho_{\alpha}^e \mu^+(t)\}$
 (Annotations: \uparrow Mittelung über Messergebnisse; \downarrow Zustandsentwicklung am Objekt)

umschreiben

$\mu_{tot}(z, t) = \sum_{\alpha} \text{Tr}\{e^{+iz\hat{O}} \mu(t) e^{-izO_{\alpha}} \rho_{\alpha}^e \otimes \bar{\rho}_B^{(e)} e^{-izO_{\alpha}} \mu^+(t) e^{+iz\hat{O}}\}$
 $= \text{Tr}\{e^{+iz\hat{O}} \mu(t) e^{-iz\hat{O}} \left(\rho_{\alpha}^e \otimes \sum_{\alpha} \bar{\rho}_B^{(e)} \right) e^{-iz\hat{O}} \mu^+(t) e^{+iz\hat{O}}\}$
 $\bar{\rho}_B = \sum_{\alpha} |e\rangle\langle e| \bar{\rho}_B |e\rangle\langle e|$

$\mu_{z_{\alpha}}(t) = e^{+iz\hat{O}} \mu(t) e^{-iz\hat{O}}$
 verallg. ZE-Operator

$[\hat{O}, H_B] = 0 \Rightarrow e^{+iH_B t} \hat{O} e^{-iH_B t} = \hat{O} = \hat{O}$

$\mu(t)$ entwickeln

$\tilde{\mu}_{z_{\alpha}}(t) = e^{+iz\hat{O}} \tilde{\mu}_V(t) e^{-iz\hat{O}} = \sum_{\alpha} \tilde{A}_{\alpha}(t) \otimes e^{+iz\hat{O}} B_{\alpha} e^{-iz\hat{O}}$
 $\mu_{z_{\alpha}}(t) = \mu - i \int_0^t dt_1 \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}(t_1) - \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \otimes (t_1 - t_2) \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}(t_1) \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}(t_2) + \dots$
 $\mu_{z_{\alpha}}^+(t) = \mu^+ + i \int_0^t dt_1 \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}^+(t_1) - \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \otimes (t_2 - t_1) \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}^+(t_1) \tilde{\mu}_{z_{\alpha}}^+(t_2) + \dots$

vorher: $\left\{ \text{Tr}\{\mu(t) \rho_{\alpha}^e \otimes \bar{\rho}_B \mu^+(t)\} \right\}$
 jetzt: $\left\{ \text{Tr}\{\mu_{z_{\alpha}}(t) \rho_{\alpha}^e \otimes \bar{\rho}_B \mu_{z_{\alpha}}^+(t)\} \right\}$
 analoges Vorgehen $\left(\text{Tr}\{H_{\alpha} \bar{\rho}_B\} = 0 \right)$

$$\begin{aligned}
& t \cdot Z_b(x) \rho_S^0 + \int_0^t dt_1 dt_2 \text{Tr}_B \{ \tilde{H}_{\text{int}}(t_2) \rho_S^0 \otimes \bar{\rho}_B \tilde{H}_{\text{int}}(t_1) \} \\
& - \int_0^t dt_1 dt_2 \Theta(t_1 - t_2) \text{Tr}_B \{ \tilde{H}_{\text{int}}(t_1) \tilde{H}_{\text{int}}(t_2) \rho_S^0 \otimes \bar{\rho}_B \} \\
& - \int dt_1 dt_2 \Theta(t_2 - t_1) \text{Tr}_B \{ \rho_S^0 \otimes \bar{\rho}_B \tilde{H}_{\text{int}}(t_2) \tilde{H}_{\text{int}}(t_1) \}
\end{aligned}$$

$\text{Tr}_B \{ e^{+i\frac{\sigma}{2}\hat{O}} B_{\text{int}}(t_1) e^{-i\frac{\sigma}{2}\hat{O}} e^{+i\frac{\sigma}{2}\hat{O}} B_{\text{int}}(t_2) e^{-i\frac{\sigma}{2}\hat{O}} \} = C_{\text{int}}(t_1, t_2)$

$$\begin{aligned}
& = \sum_{\sigma_B} \int dt_1 dt_2 \left[C_{\text{int}}^{\sigma_B}(t_1, t_2) A_B(t_2) \rho_S^0 A_B(t_1) \right. \\
& \quad \left. - \Theta(t_1 - t_2) C_{\text{int}}(t_1, t_2) A_B(t_1) A_B(t_2) \rho_S^0 - \Theta(t_2 - t_1) C_{\text{int}}(t_1, t_2) \rho_S^0 A_B(t_1) A_B(t_2) \right]
\end{aligned}$$

$$C_{\text{int}}^{\sigma_B}(t_1, t_2) = \text{Tr}_B \left\{ e^{-i\hat{O}\frac{\sigma}{2}} B_{\text{int}}(t_1) e^{+i\hat{O}\frac{\sigma}{2}} e^{+i\hat{O}\frac{\sigma}{2}} B_{\text{int}}(t_2) e^{-i\hat{O}\frac{\sigma}{2}} \bar{\rho}_B \right\}$$

überrallg. Korrelations-Fkt. w/ ZF

- falls $[\hat{H}_B, \bar{\rho}_B] = 0 \implies C_{\text{int}}^{\sigma_B}(t_1 - t_2) = \text{Tr} \left\{ e^{-i\hat{O}\sigma} \tilde{B}_{\text{int}}(t_2) e^{+i\hat{O}\sigma} B_{\text{int}} \bar{\rho}_B \right\}$
 $[\hat{O}, \bar{\rho}_B] = 0$
- falls $[\hat{H}_B, \bar{\rho}_B] \neq 0 \quad \bar{\rho}_B = \sum_e |e\rangle\langle e| \bar{\rho}_B |e\rangle\langle e| = \bar{\rho}_B$
- falls $\hat{O} = H_B \quad C_{\text{int}}^{\sigma_B}(\tau) = C_{\text{int}}(\tau - \pi)$

CG-Messungl. w/ ZF:

$$\begin{aligned}
\tilde{\rho}_S = - & \left[\frac{1}{2\hat{O}} \int_0^{\hat{O}} dt_1 dt_2 \sum_{\sigma_B} C_{\text{int}}(t_1 - t_2) \text{sgn}(t_1 - t_2) \tilde{A}_B(t_1) \tilde{A}_B(t_2), \rho_S \right] \\
& + \frac{1}{\hat{O}} \int_0^{\hat{O}} dt_1 dt_2 \sum_{\sigma_B} \left[C_{\text{int}}^{\sigma_B}(t_1 - t_2) \hat{A}_B(t_1) \rho_S \hat{A}_B(t_2) - \frac{1}{2} C_{\text{int}}(t_1 - t_2) \{ \tilde{A}_B(t_1) \tilde{A}_B(t_2), \rho_S \} \right]
\end{aligned}$$

$\implies \rho(x, t) \implies \text{MGF } M(x, t) = \text{Tr} \{ \rho(x, t) \}$

◦ BKS-Lines $\implies \hat{O} \rightarrow \infty$

◦ Warum? QPC

